

Supraxime®

Cefalosporina de tercera generación
Polvos para suspensión y cápsulas

COMPOSICIÓN

Supraxime® Cápsulas

Cada cápsula contiene:

Cefixima (agregada como trihidrato).....400 mg

Excipientes c.s.

Supraxime® Suspensión

Cada 5 mL contiene:

Cefixima trihidrato equivalente a cefixima100 mg

Excipientes c.s.

DOSIS

Mayores de 12 años de edad o aquellos con mas de 50 Kg de peso y adultos

Indicaciones	Duración de Tratamiento	Dosis
• Infecciones urinarias no complicadas • Infecciones del tracto respiratorio superior	5 - 10 días	400 mg diarios (20 mL de suspensión)
• Infecciones del tracto respiratorio inferior • Otitis media	10 - 14 días	
• Gonorrea no complicada	Dosis única	200 mg dos veces al día

Niños de 6 meses a 12 años de edad

Indicaciones	Duración de Tratamiento	Dosis
• Infecciones urinarias no complicadas • Infecciones del tracto respiratorio superior	5 - 10 días	6 meses a 2 años - 2.5 mL diarios 3 a 5 años - 5 mL diarios 6 a 9 años - 10 mL diarios
• Infecciones del tracto respiratorio inferior • Otitis media	10 - 14 días	10 a 12 años - 15 mL diarios o calcular 8mg/Kg/24 h.

DOSIS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL

- Adultos con aclaramiento de creatinina de 21-60 mL/min o aquellos con hemodiálisis deben administrárseles el 75% de la dosis usual de cefixima [300 mg diarios].
- Adultos con aclaramiento de creatinina menor de 20 mL/min o aquellos con diálisis peritoneal ambulatoria deben administrárseles el 50% de la dosis usual de cefixima [200 mg diarios].

MODO DE PREPARACIÓN:

Instrucciones de preparación

Muestra Médica:

1. Agite el frasco antes de preparar la suspensión.
2. Agregue agua fría previamente hervida hasta la marca A de la etiqueta.
3. Agite el frasco.
4. Continúe agregando agua hasta el cuello del frasco y siga agitando.
5. La suspensión reconstituida sigue conservando su potencia durante 14 días en refrigeración.



INDICACIONES:

Supraxime® es utilizado en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas, como: infecciones del tracto urinario no complicadas causadas por *Escherichia coli* o *Proteus mirabilis*. Otitis media causada por *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*.


Infecciones del tracto respiratorio causadas por organismos susceptibles. Tratamiento de faringitis y amigdalitis causadas por *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae* u otros estreptococos; bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica causada por *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*. Otras infecciones del tracto respiratorio como sinusitis y neumonía. Gonorrea no complicada e infecciones asociadas causadas por *Neisseria gonorrhoeae*.

Supraxime®

Instrucciones de preparación

Original:

1. Agite el frasco antes de preparar la suspensión.
2. Agregue agua fría previamente hervida hasta la marca A.
3. Agite el frasco.
4. Continúe agregando agua hasta la marca B
5. Continúe agitando.
6. La suspensión reconstituida sigue conservando su potencia durante 14 días en refrigeración.



MECANISMO DE ACCIÓN:

Antibiótico perteneciente al grupo de cefalosporinas de tercera generación, se une a proteínas fijadoras de penicilinas que intervienen en las síntesis de pared bacteriana, e inhibe la acción de las mismas, lo que provoca la lisis o muerte bacteriana.

CONTRAINDICACIONES:

- La cefixima está contraindicada en pacientes hipersensibles al medicamento u otras cefalosporinas.
- Debe ser utilizada con precaución en individuos hipersensibles a las penicilinas, por su similitud estructural.
- La cefixima debe ser utilizada con precaución en pacientes con historia de enfermedad gastrointestinal, particularmente colitis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Las dosis y frecuencia de administración de la cefixima, debe ser disminuida en pacientes con insuficiencia renal, ya que la concentración de cefixima en plasma son mayores y más prolongadas en estos pacientes.

EFFECTOS ADVERSOS:

La cefixima es bien tolerada, muchos efectos adversos de la droga son pasajeros y van de leve a moderado en severidad. Efectos adversos han sido reportados en 50% de los pacientes quienes han recibido el medicamento, pero solamente en 5% de ellos se ha necesitado discontinuar su administración.

- Los efectos adversos más frecuentes que involucran al tracto gastrointestinal: Diarrea o colitis pseudomembranosa, dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómito, dispepsia, flatulencia, prurito anal y sequedad en la boca.
- Efectos en el sistema nervioso: Dolor de cabeza, vértigo, agitación, insomnio, somnolencia, lasitud y fatiga. Si ocurren convulsiones durante la terapia con cefixima, el medicamento debe ser discontinuado y administrarse un anticonvulsivo adecuado.
- Reacciones de hipersensibilidad: Rash, urticaria, fiebre, prurito y artralgia. Efectos renales y hepáticos.
- Prurito genital, vaginitis y candidiasis vaginal.

INTERACCIONES:

Si se administra junto con sustancias potencialmente nefrotóxicas produce aumento de deterioro de la función renal. Nifedipina aumenta 70 % la biodisponibilidad de cefixima. Reduce eficacia de anticonceptivos orales. Aumento en el tiempo de protrombina, interacción con anticoagulantes. Faso positivo de glucosa en orina,

PRESENTACIONES:

Supraxime® Cápsulas	Caja 7 cápsulas
Supraxime® Suspensión	Frasco 50 mL Frasco 100 mL

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.