

Esfinto Plus®

CREMA PERIANAL
Tubo 20 g
Administración tópica


COMPOSICIÓN

Cada 100 gramos de crema contiene:

Dinitrato de isosorbide.....	0.200 g
Lidocaína.....	5.00 g
Hidrocortisona.....	0.25 g
Óxido de Zinc.....	18.00 g

DOSIS Y MODO DE USO

- Apriete suavemente el tubo hasta una línea de pomada de la longitud de su tercio más distal de dedo índice. Aplíquelo en la mucosa ano-rectal, 3 veces al día de 4 a 6 semanas, y/o 5 minutos antes de defecar, o según indique su médico.
- Si se pasa una dosis, aplíquela tan pronto como sea posible. Si es casi la hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario regular de dosificación.
- Utilizar en fase aguda, aplicando con el dedo en la periferia anal, use sobre área limpia.



- No utilizar cánula para aplicar Esfinto Plus®, debido a que esto puede lastimar el área que se encuentra afectada, e introducir el medicamento a mayor profundidad de la requerida, lo que podría retrasar el efecto terapéutico.

INDICACIONES:

PROCTOLOGÍA: Fisura anal, hemorroides trombosados, para disminuir el dolor post-cirugía anal, espasmo del esfínter interno, dolor al defecar, estreñimiento terminal.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Dinitrato de Isosorbide actúa como neurotransmisor donador del óxido nítrico, mediando la vasodilatación arterial y venosa, mejorando el aporte de oxígeno muscular, regulando las funciones fisiológicas perturbadas.

La lidocaína actúa como analgésico tópico para ayudar a aliviar el dolor intenso provocado por las hemorroides trombosadas.

La hidrocortisona, un corticoide no fluorado, posee acción antiinflamatoria y conlleva la inhibición de las manifestaciones inmediatas (rubor, calor, dolor, tumefacción) y tardías de la inflamación.

En algunas hemorroides trombosadas ocurre una excoriación del anodermo, donde actúa el óxido de zinc como cicatrizante.

Esfinto Plus®

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes activos de Esfinto Plus® , colapso cardiovascular.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- En el primer trimestre del embarazo solo se aplicará el medicamento ante indicación muy estricta por el médico al evaluar riesgos contra beneficios.
- Obsérvese la fecha de vencimiento.
- El medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Posibles variaciones de coloración son insignificantes y no afectan de ningún modo la eficacia del preparado.

EFECTOS ADVERSOS:

La mayoría de pacientes no presentan reacciones adversas. Consulte con su médico si cualquiera de estos efectos secundarios más comunes persisten o se vuelve molesto; mareo; desmayo tras el reposo o dolor de cabeza.

Busque atención médica de inmediato si presenta cualquiera de estos efectos secundarios graves: Reacciones alérgicas severas (erupción, urticaria, picor, dificultad para respirar, opresión en el pecho, hinchazón de la boca, cara, labios, garganta o lengua); desmayo: enrojecimiento; rojo, hinchazón, ampollas, o descamación de la piel.

Esta no es una lista completa de todos los efectos secundarios que pueden ocurrir. Si usted tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, contacte a su proveedor de atención médica. Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios.

INTERACCIONES:

Los antihipertensivos, antagonistas del calcio, antidepresivos tricíclicos y el alcohol refuerzan el efecto de Esfinto Plus®, pudiendo producir hipotensión.

PRESENTACIONES:

Esfinto Plus®

Tubo 20 gramos

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.