

Clotrizinc®

Cicatrizante-antimicótico-protector

Crema

Administración tópica

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de crema contiene:

Clotrimazol..... 1.00 g
Óxido de Zinc..... 20.00 g
Excipientes c.s.

DOSIS

Aplicar una capa fina 2 ó 3 veces al día o según indicación del médico.

INDICACIONES:

Para tratamiento de dermatitis por pañal, erupciones inflamatorias y pruriginosas (contra el hongo) del área que cubre el pañal, en niños. Irritaciones (escaldaduras) en personas con encamamiento prolongado.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Clotrizinc reúne en su fórmula, el efecto antifúngico del clotrimazol más el efecto secante, antiinflamatorio y protector del óxido de zinc.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia conocida a cualquiera de los componentes.

EFEKTOS ADVERSOS:

Comezón, irritación, enrojecimiento, hinchazón, dolor de estómago, fiebre, secreción fétida.

CONTRAINDICACIONES:

Clotrizinc crema Tubo de 20 g.

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.