

# Doloneuroheidelg®

Antineurítico – Analgésico – Antiinflamatorio  
Solución inyectable administración I.M.  
Tabletas administración oral

## COMPOSICIÓN

---

Cada ampolla # 1 contiene:

Cianocobalamina (B12).....4000 mcg/mL  
Hidroxicobalamina (B12).....1000 mcg/mL  
Tiamina HCl (B1).....100 mg/mL  
Piridoxina HCl (B6).....100 mg/mL  
Excipientes c.s.....1 mL

Cada ampolla # 2 contiene:

Diclofenaco sódico.....75 mg  
Excipientes c.s.....2 mL

Cada tableta contiene:

Diclofenaco.....50 mg  
Piridoxina Clorhidrato.....50 mg  
Tiamina Mononitrato.....50 mg  
Cianocobalamina.....1 mg  
Excipientes c.s.....2 mL

## DOSIS

---

Administración parenteral: Una dosis al día (1 ampolla # 1 + 1 ampolla # 2) vía I.M.  
Administración oral: una tableta 1-3 veces al día.

## INDICACIONES:

---

Doloneuroheidelg está indicado en neuritis y neuralgias, tales como síndrome cervical, lumbago y ciática. Procesos reumáticos dolorosos, tanto inflamatorios como degenerativos, activado por inflamación, como artrosis, espondiloartrosis, poliartritis anquilosante (Morbus bechterew), ataque agudo de gota. Reumatismo de los tejidos blandos y afecciones inflamatorias dolorosas no reumáticas.

## MECANISMO DE ACCIÓN:

---

Las vitaminas del complejo B intervienen en el metabolismo de los carbohidratos, actúan como coenzima en varias transformaciones metabólicas de los aminoácidos, intervienen en la síntesis de los siguientes neurotransmisores, ácido gamma-aminobutírico, dopamina, serotonina, así como en la síntesis de los esfingolípidos que constituyen la vaina de mielina. Participan en la síntesis de ácidos nucleicos, en la síntesis de la vaina de mielina de las fibras nerviosas y en el proceso de maduración de los eritrocitos. El diclofenaco inhibe la biosíntesis de prostaglandinas.

## CONTRAINDICACIONES:

---

No se administre durante el embarazo y lactancia, ni en niños menores de 12 años.

# Doloneuroheidelg®

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:



Al mezclar el contenido de las dos ampollas, este presenta una colocación lechosa misma que desaparece inmediatamente agitando la jeringa. Inyectar de inmediato.



Debajo de 12° C la ampolla II puede presentar partículas cristalinas que se eliminan al aumentar la temperatura frotando la ampolla entre las manos.

## EFFECTOS ADVERSOS:

Ocasionalmente se ha observado: vómitos, diarreas; cefaleas, irritabilidad, insomnio, cansancio, mareos, erupción cutánea y picazón. En casos aislados y de muy poca frecuencia se ha observado: colitis hemorrágica, visión borrosa, diplopía, zumbido de oídos, urticaria eczema, eritema, insuficiencia renal, lesiones hepáticas, pancreatitis y alteraciones hematopoyéticas.

## INTERACCIONES:

Se debe evitar el uso simultáneo de Doloneuroheidelg con otros medicamentos tales como: digoxina, litio, diuréticos, antihipertensivos, glucocorticoides, metotrexato, ácido acetilsalicílico y L-dopa.

## PRESENTACIONES:

Doloneuroheidelg Inyectable	Caja con una dosis de solución inyectable de 2 ampollas (1 ampolla #1 +1 ampolla #2) con jeringa descartable.
Doloneuroheidelg TRIPACK	Caja con 3 ampollas I de 1mL (Vit. Neurotropas) + Ampolla II de 2mL + 3 jeringas descartables 5mL.
Doloneuroheidelg Tabletas	Caja 20 tabletas y Caja 120 tabletas

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.  
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.  
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.