

Folacid®

ANTIANÉMICO
Tableta recubierta
Administración oral

COMPOSICIÓN

Folacid

Cada tableta recubierta contiene:

Ácido Fólico.....5
mg

DOSIS

ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS: la dosis inicial es de 2 a 4 comprimidos durante 14 días y ½ a 2 comprimidos como dosis de mantenimiento.

Niños: 1 a 3 comprimidos de acuerdo con la severidad. Por mala absorción, la dosis es de 1 comprimido diariamente durante 4 meses.

Uso profiláctico: 1 cápsula, por no más de tres meses al año.

INDICACIONES:

Folacid está indicado en Anemia megaloblástica. Anemias asociadas a Esprue o enfermedad celiaca. Situaciones que precisan un aporte suplementario de ácido fólico. Anemia hemolítica, talasemia, embarazo y lactancia.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Folacid actúa como cofactor en la síntesis de ADN, resultado por tanto imprescindible para el crecimiento celular. El ácido fólico está presente en numerosos alimentos, pero es destruido en los procesos de cocción. Su deficiencia puede resultar por una dieta inadecuada o bien por alteraciones de su absorción intestinal. El aporte insuficiente de ácido fólico al organismo afecta al sistema hematopoyético debido a su alta velocidad de división celular, dando lugar a anemia megaloblástica, que no puede diferenciarse de la causada por la deficiencia de vitamina B12. La aparición de anemia megaloblástica consecuente a la privación del aporte de ácido fólico es muy rápida, pues sus reservas en el organismo son limitadas.

CONTRAINDICACIONES:

Folacid está contraindicado en Anemia por déficit de vitamina B12, por aumentar los requerimientos de esta.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No ingerir > 1 mg/día, sino es bajo prescripción y descartando una anemia por déficit de vitamina B12 en el caso de mujeres gestantes sin antecedentes de defecto neural, ya que puede enmascarar síntomas de anemia perniciosa, por esta razón tampoco debe administrarse en anemia cuya etiología sea desconocida.

Folacid®

EFFECTOS ADVERSOS:

Cardiovasculares: rubor leve. Sistema Nervioso Central: irritabilidad, dificultad para dormir, confusión malestar general. Dermatológicas: prurito, exantema. Gastrointestinales: anorexia, distensión abdominal, flatulencia y náusea. Diversas: reacciones de hipersensibilidad.

INTERACCIONES:

Los anticonceptivos orales, la fenitoína, cicloserina, primidona, barbitúricos y el alcoholismo crónico pueden disminuir la biodisponibilidad del ácido fólico.

PRESENTACIONES:

Folacid® Tabletas

Caja con 30 tabletas recubiertas

Caja con 60 tabletas recubiertas

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.