

Geriaiking® Vital

Panax ginseng, Ginkgo biloba, vitaminas y minerales.

Cápsulas

Administración oral

COMPOSICIÓN

Vitamina B1 (Tiamina nitrato).....	6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina).....	2.75 mg
Vitamina B3 (Niacinamida).....	20 mg
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato).....	6
m	g
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	30
m	g
Vitamina C (Ácido Ascórbico).....	30 mg
Vitamina E (Alfa succinato de tocoferol).....	10 mg
Zinc (Como óxido de zinc).....	1 mg
Hierro (Como fumarato ferroso).....	4.02
m	g
Calcio (carbonato de calcio).....	80.08 mg
Ácido L- glutámico HCL.....	125 mg

DOSIS

Una cápsula diaria con la comida principal.

INDICACIONES:

Geriaiking® Vital ayuda en la prevención de estados carenciales de los componentes de la fórmula, debido al incremento de las necesidades, reducción del consumo o reducción de la absorción, que podrían manifestarse en estados de convalecencia o dietas insuficientes. Ayuda al rendimiento físico y mental.

MECANISMO DE ACCIÓN:

La raíz de la planta contiene ginsenósidos, sustancias activas que almacenan grandes cantidades de nutrientes que funcionan como estimulantes del sistema nervioso y del sistema inmunológico.

Los ginsenósidos poseen vitaminas y minerales, tales como:

- Vitamina B:** Beneficia el funcionamiento del sistema nervioso; estudios señalan que mantener los niveles adecuados de esta vitamina, mejora el estado de ánimo del individuo.
- Vitamina C:** Principal productora de colágeno, vital para el crecimiento y reparación de los tejidos y para mantener los niveles adecuados de colesterol en la sangre.
- Vitamina E:** Generadora de oxígeno que prolonga la vida celular y disminuye los síntomas del envejecimiento.
- Fósforo:** Junto al calcio facilita la formación de huesos y dientes. Se relaciona con la asimilación de alimentos y la producción de energía.
- Hierro:** Co-generador de hemoglobina, que es la encargada de llevar oxígeno a las células de todo el cuerpo.

Geriaking® Vital

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, embarazo, lactancia, en pacientes con desórdenes en el metabolismo del calcio (hipercalciuria o hipocalciuria), en caso de hipervitaminosis A o D, en insuficiencia renal, durante la terapia con retinoides (p.e para acné) o vitamina D.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Evite su ingesta en menores de 18 años. No mezcle con otras medicinas como la aspirina ya que puede ocasionar un ataque al corazón. No deben ingerirlo hemofílicos y personas con problemas de hipertensión.

EFECTOS ADVERSOS:

A dosis altas el *Ginseng* puede provocar ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, arritmias cardíacas, cefaleas, temores y manías, dolor en el pecho, efectos estrogénicos, cambios en la menstruación, estos efectos remiten al disminuir la dosis o discontinuar el tratamiento. No se recomienda el uso de *Ginseng* por más de 3 meses. En pacientes con tendencia al sangrado abundante, la toma de preparados de *Ginkgo* debe suspenderse 3-4 días antes de una intervención quirúrgica. En pacientes con epilepsia no es descartable que la ingestión de preparados de *Ginkgo* pueda ser causa de la aparición de nuevas crisis.

Se han observado casos de cefalea, mareo, reacciones gastrointestinales (náuseas, dolor de estómago, vómito y diarrea) y reacciones de hipersensibilidad (como rash, prurito).

INTERACCIONES:

Un estudio con *Ginseng* mostró reducir el efecto de los anticoagulantes. Si usted está tomando o planea tomar anticoagulantes. Antes de iniciar la toma de este producto, por favor consulte a su médico. El *Ginseng* interacciona con los IMAOs, puede potenciar su efecto y provocar la aparición de crisis hipertensivas, cefaleas, temores, manías. Antes de tomar este producto consulte a su médico si está bajo tratamiento, consume productos de venta libre, incluyendo productos naturales y suplementos. Puede no ser capaz de consumir este producto o deba ajustar la dosis del medicamento.

PRESENTACIONES:

Geriaking® Vital

Frasco con 30 cápsulas.
Frasco con 60 cápsulas.

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.