

Neuro Instaflam DK®

ANTINEURÍTICO-ANALGÉSICO-ANTIINFLAMATORIO

- Solución inyectable

Vía de administración intramuscular

- Tabletas Recubiertas

Vía de administración oral.

COMPOSICIÓN

Cada ampolla de vitaminas Neurotropas 5000 contiene:

Cianocobalamina (B12).....	4000 mcg
Hidroxocobalamina (B12).....	1000 mcg
Tiamina HCl (B1).....	100 mg
Piridoxina HCl (B6).....	100 mg
Excipientes c.s.	

Cada tableta recubierta contiene:

Dexketoprofeno Trometamol eq. a base.....	25 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato).....	50 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl).....	50 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina).....	1000 mcg
Excipientes c.s.	

Cada ampolla de **Instaflam** DK contiene

Dexketoprofeno trometamol equivalente a

Dexketoprofeno base.....50 mg

Excipientes c.s.

MODO DE PREPARACIÓN PARA AMPOLLAS

En una misma jeringa y aguja esterilizada, extraígase el contenido de ampollas de Neurotropas y después el contenido de la Ampolla de Instaflam DK. Agítese. Administrar de inmediato.

DOSIS

Una dosis de **Neuroinstaflam** DK por vía intramuscular profunda al día, según prescripción médica.

Una o dos tabletas de **Neuroinstaflam** Dk vía oral cada 8 horas.

INDICACIONES:

Neuroinstaflam DK combina el efecto analgésico y desinflamatorio del Dexketoprofeno con el efecto analgésico y Neuroregenerativo de las Neurotropas, alcanzando un efecto terapéutico potente contra los dolores moderados a intensos ocasionados por neuritis y neuralgias, tales como síndrome cervical, lumbago y ciática. Procesos reumáticos fuertemente dolorosos, tanto inflamatorios como degenerativos, activados por inflamación, como artrosis, espondiloartrosis, poliartritis anquilosante (Morbus Bechterew), ataque agudo de gota, y afecciones inflamatorias dolorosas no reumáticas.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Instaflam DK o Dexketoprofeno disminuye la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la ciclooxigenasa.

Las vitaminas neurotropas tienen la propiedad de actuar como coenzimas en el metabolismo de los aminoácidos, grasas y carbohidratos, ejerciendo una acción eficaz sobre las células nerviosas y de casi todos los tejidos.

Neuro Instaflam **DK**®

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicado en úlceras pépticas, gastritis y duodenitis. Discrasias sanguíneas, estados hemorrágicos y lesiones hepáticas. Personas que presentan alergias a este producto, o a cualquiera de sus componentes, a la aspirina o a otros antiinflamatorios no esteroideos. Personas que sufren ataques de asma, broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales, urticaria, angioedema (hinchazón de la cara, ojos, labios, o lengua, o dificultad para respirar), tras haber tomado aspirina u otro antiinflamatorio no esteroideo. Si tiene o ha tenido úlcera, o trastornos de la coagulación de la sangre o está tomando un anticoagulante. En caso de embarazo o periodo de lactancia. Hipersensibilidad a alguno de sus principios activos. Por contener alcohol bencílico, no administrarse a niños menores de 6 meses.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No se administre durante el embarazo y lactancia, ni en niños menores de 12 años, o según criterio médico. El producto inyectable contiene alcohol bencílico, por lo cual no debe ser administrado a niños menores de 6 meses.

EFFECTOS ADVERSOS:

Ocasionalmente se ha observado: Vómitos, diarreas; cefaleas, irritabilidad, insomnio, cansancio, mareos, erupción cutánea y picazón. En casos aislados y de muy poca frecuencia se ha observado: Colitis hemorrágica, visión borrosa, diplopía, zumbido de oídos, urticaria eczema, eritema, insuficiencia renal, lesiones hepáticas, pancreatitis y alteraciones hematopoyéticas.

INTERACCIONES:

Se debe evitar el uso simultaneo de **Neuroinstaflam DK** con otros medicamentos tales como: digoxina, litio, diuréticos, antihipertensivos, glucocorticoides, metotrexato, ácido acetilsalicílico y L-dopa.

PRESENTACIONES:

Neuroinstaflam DK Inyectable	caja con 1 ampolla de 1 ml (Vit. Neurotropas) + ampolla de 2 ml (Dexketoprofeno) + jeringa descartable.
Neuroinstaflam DK TRIPACK	caja con 3 ampollas de 1 ml (Vit. Neurotropas) + ampolla de 2 ml +3 jeringas descartables 5ml
Neuroinstaflam Dk	Caja con 10 tabletas recubiertas

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.