HEIDELG PHARMA®

Ulciless® MG

INHIBIDOR DE LA BOMBA DE PROTONES
Cápsulas con gránulos entéricos

COMPOSICIÓN

Ulciless® MG Cápsulas
Cada cápsula contiene:
Esomeprazol.....40 mg
Excipientes c.s.

DOSIS

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
-Tratamiento de la esofagitis erosiva:
40mg una vez al día durante 4 a 8 semanas. Se recomienda un tratamiento adicional de 4 a 8 semanas en los pacientes cuya esofagitis no se haya curado o que presenten síntomas.

-Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática:
40 mg una vez al día por 4 semanas. Si los síntomas no se resuelven, se puede ofrecer un esquema adicional de 4 semanas.

-Para reducción del riesgo de úlceras gástricas asociada a la administración de antiinflamatorios no esteroideos (AINES):
40mg una vez al día hasta por 6 meses.

-Erradicación de Helicobacter Pylori para reducir el riesgo de úlcera duodenal recurrente:
En asociación con amoxicilina, claritromicina o levofloxacina, 40mg al día por 10 días.

INDICACIONES:

Ulciless® MG está indicado para:
- El tratamiento de corto plazo (de 4 a 8 semanas) de los síntomas de esofagitis erosiva.
-El tratamiento de mantenimiento de la esofagitis erosiva.
-El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
-Para la reducción del riesgo de úlceras gástricas asociadas al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINES).
-En asosación con amoxicilina y claritromicina, para la erradicación de *Helicobacter Pylori,* para reducir el riesgo de recurrencia de úlceras duodenal.

MECANISMO DE ACCIÓN:

FALTA....

HEIDELG PHARMA®

Ulciless® MG

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al ingrediente activo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Ulciless® MG es un medicamento categoría B. Estudios en animales no han demostrado ningún efecto en el feto a dosis superiores a las recomendadas. Debe utilizarse si el potencial de beneficio supera el de riesgo.

EFECTOS ADVERSOS:

El efecto adverso más comunmente reportado ha sido el dolor de cabeza y la diarrea. Otros efectos adversos reportados: náusea, flatulencia, constipación y resequedad de boca.

INTERACCIONES:

Ulciless® MG puede ser usado concomitantemente con antiácidos. Cuando se utiliza Ulciless® MG en conbinación con warfarina, debe hacerse un monitoreo de los tiempos de protombina e INR, pues se ha observado incremento en éstos parámetros. Ulciless® MG inhibe la secreción gástrica y por lo tanto puede interferir con la acción de aquellos medicamentos que requieren de un pH ácido para su absorción, como por ejemplo: ketoconazol, sales de hierro y digoxina.

PRESENTACIONES:

Ulciless® MG	Caja con 14 cápsulas con gránulos entéricos Caja con 28 cápsulas con gránulos entéricos

PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

HEIDELG PHARMA®

info@grupomercafarma.com

High Quality manufacturing at low prices