

Denk
Pharma

Cipro-Denk 500 mg

Comprimidos con cubierta pelicular

Para uso oral

Antibiótico – Fluorquinolona

Principio activo: ciprofloxacina

Prospecto: Información para el paciente

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

– Consérve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

– Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

– Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.

– Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Cipro-Denk 500 mg y para qué se utiliza

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cipro-Denk 500 mg

3. Cómo tomar Cipro-Denk 500 mg

4. Posibles efectos adversos

5. Conservación de Cipro-Denk 500 mg

6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Cipro-Denk 500 mg y para qué se utiliza

Cipro-Denk 500 mg contiene el principio activo ciprofloxacina. Ciprofloxacina es un antibiótico que pertenece al grupo de las fluorquinolonas. Ciprofloxacina actúa eliminando las bacterias que causan infecciones. Sólo actúa con cepas específicas de bacterias.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarral.

Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico. No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.

Advertencias y precauciones

Antes de empezar a tomar este medicamento

No debe tomar Cipro-Denk 500 mg, si ha experimentado alguna reacción adversa grave con anterioridad a tomar una quinolona o una fluorquinolona. Si este es su caso, debe informar a su médico lo antes posible.

Adulteros

Cipro-Denk 500 mg se utiliza en adultos para tratar las siguientes infecciones bacterianas:

- ciertas infecciones de las vías respiratorias
- ciertas formas duraderas o recurrentes de inflamación del oído o los senos paranasales
- infecciones de las vías urinarias
- infecciones de los órganos genitales femeninos o masculinos
- infecciones del tubo digestivo e infecciones de la cavidad abdominal
- ciertas infecciones de la piel y los tejidos blandos
- infecciones de los huesos y las articulaciones
- para prevenir las infecciones causadas por la bacteria Neisseria meningitidis
- tratamiento tras la inhalación de los patógenos del carbunclo (antrax)

Suspenda este medicamento inmediatamente al presentar los primeros signos o síntomas de cualquier reacción adversa grave. Además, evite el uso de fluorquinolonas, incluyendo este medicamento, en pacientes que han experimentado cualquiera de estas reacciones adversas graves asociadas con fluorquinolonas.

Tendinitis y rotura de tendón

Las fluorquinolonas se han asociado con un mayor riesgo de tendinitis y rotura del tendón en todas las edades. Esta reacción adversa con mayor frecuencia involucra el tendón de Aquiles y también se ha informado de la primera dosis. Si estas reacciones ocurren en pacientes que reciben este medicamento, suspendálo inmediatamente y no continúe su uso. La tendinitis y rotura del tendón puede ocurrir luego de horas o días de haber comenzado el tratamiento con fluorquinolonas o hasta varios meses después de la finalización de la terapia. La tendinitis y rotura del tendón puede ocurrir bilateralmente.

El riesgo de desarrollar tendinitis y rotura del tendón asociado con la uso de una fluorquinolona se incrementa en pacientes mayores de 60 años, en los pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con trasplantes de órganos sólidos (p. ej. riñón, corazón o pulmón) y en pacientes que toman corticosteroides. Por lo tanto, debe evitarse el uso combinado de corticosteroides. Otros factores que pueden aumentar independientemente el riesgo de ruptura del tendón incluyen la actividad física extenuante, la insuficiencia renal y los trastornos del tendón previos como la artritis reumatoide. La tendinitis y rotura del tendón también se han producido en pacientes que toman fluorquinolonas que no tienen los factores de riesgo anteriores. Por lo cual se debe suspender inmediatamente este medicamento si el paciente experimenta dolor, hinchazón, inflamación o rotura de un tendón. Se debe aconsejar a los pacientes que descansen al primer signo de tendinitis o rotura del tendón y que se pongan en contacto con su médico para cambiar a un medicamento antimicrobiano que no sea quinolona. Se deben tratar de manera apropiada (p.ej., inmovilización) las extremidades afectadas. No se debe utilizar corticosteroides si se producen signos de tendinitis.

Si usted o un familiar suyo padece de una enfermedad hereditaria de tendinitis (como "badicardia"), tiene un corazón delicado (insuficiencia cardíaca), tiene un historial de ataques cardíacos (infarto de miocardio), usted es una mujer o un anciano, o está tomando otros medicamentos que resulten en cambios anormales del ECG (ver sección "Otros medicamentos y Cipro-Denk 500 mg").

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cipro-Denk 500 mg

No tome Cipro-Denk 500 mg

• si es alérgico a la ciprofloxacina, a otras quinolonas o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

• si toma tizanidina (ver sección 2: "Otros medicamentos y Cipro-Denk 500 mg").

Advertencias y precauciones

Antes de empezar a tomar este medicamento

No debe tomar Cipro-Denk 500 mg, si ha experimentado alguna reacción adversa grave con anterioridad a tomar una quinolona o una fluorquinolona. Los síntomas pueden ocurrir poco después del inicio del medicamento.

Suspender este medicamento inmediatamente si el paciente experimenta síntomas de neuropatía periférica incluyendo dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento o debilidad para caminar, sensaciones anormales tales como pinchazos, hormigueo, cosquilleo, entumecimiento y quemazón (parestesia), trastornos sensitivos tales como disminución de la visión, del gusto, del olfato y de la audición, depresión, disminución de la memoria, fatiga intensa y trastornos graves del sueño.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Efectos sobre el sistema nervioso central

Los síntomas más comunes incluyen tendinitis, rotura del tendón, alergia, migraña, neuropatía periférica y efectos en el sistema nervioso central (alucinaciones, ansiedad, depresión, insomnio, dolores de cabeza severos y confusión). Estas reacciones pueden ocurrir dentro de horas a semanas después de iniciar el medicamento. Los pacientes de cualquier edad o sin factores de riesgo preexistentes han experimentado estas reacciones adversas.

Suspenda este medicamento inmediatamente al presentar los primeros signos o síntomas de cualquier reacción adversa grave. Además, evite el uso de fluorquinolonas, incluyendo este medicamento, en pacientes que han experimentado cualquiera de estas reacciones adversas graves asociadas con fluorquinolonas.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Otros efectos adversos que se han observado durante el tratamiento con Cipro-Denk 500 mg

Tómese la dosis normal tan pronto como sea posible y, después, continúe el tratamiento tal como se ha recetado. Sin embargo, si es casi la hora de su siguiente toma, no tome la dosis olvidada y continúe de la forma habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Asegúrese de completar el ciclo de otra clase.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar Cipro-Denk 500 mg, póngase en contacto de forma inmediata con su médico.

