Farmacode

# Flunil
(Flunarizina)

Atral

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**
- ➔ Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- ➔ Si tiene alguna duda, consulte a su médico, o farmacéutico.
- ➔ Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- ➔ Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sesión 4.

**Contenido del prospecto:**


**1.** Qué es **Flunil** y para qué se utiliz
**2.** Qué necesita saber antes de empezar a tomar **Flunil**
**3.** Cómo tomar **Flunil**
**4.** Posibles efectos adversos
**5.** Conservación de **Flunil**
**6.** Contenido del envase e información adicional


## 1. QUE ES FLUNIL Y PARA QUE SE UTILIZA

La sustancia activa de **Flunil** es flunarizina (bajo la forma de diclorhidrato de flunarizina).
Está indicado en la prevención de la migraña y para aliviar los síntomas del vértigo vestibular (cuando es debido a alteraciones del sistema vestibular del oído).

## 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR FLUNIL

**No tome Flunil:**
Si es alérgico al principio activo (flunarizina) o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (Incluidos en la sección 6).
Si padece depresión o la ha sufrido con anterioridad.
Si tiene síntomas de Parkinson u otras alteraciones extrapiramidales (alteraciones del movimiento o de la coordinación).

**Advertencias y precauciones:**
Consulte a su médico o farmacéutico,
si presenta un aumento de fatiga progresivo durante el tratamiento. En este caso, su médico deberá suspender el tratamiento.

Si toma **Flunil** durante algunos meses
Este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con insuficiencia hepática, glaucoma o prostatismo. Como sucede con otros medicamentos, la flunarizina puede causar malestar epigástrico. La administración después de las comidas puede disminuir estos síntomas.

**Uso de FLUNIL con otros medicamentos:**
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Si está tomando **Flunil**, los hipnóticos y los tranquilizantes pueden producirle somnolencia y adormecimiento más rápidamente. Sólo deberá tomar hipnóticos y tranquilizantes si su médico se los prescribe.

**Toma de Flunil con alimentos, bebidas y alcohol**
Si toma **Flunil** junto con alcohol puede aparecer somnolencia y adormecimiento más rápidamente.
Se deberá limitar la cantidad de alcohol que ingiere.

**Embarazo y Lactancia**
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
No hay datos del uso de flunarizina en mujeres embarazadas.
Se desconoce si la flunarizina pasa a la leche materna, por ello, no se recomienda tomar **Flunil** a menos que su médico se lo indique específicamente.

**Conducción y uso de máquinas:**
Al principio del tratamiento, **Flunil** puede producir somnolencia, por lo que se deberá tener especial precaución cuando se conduzca o utilice maquinaria.

**Flunil contiene lactosa**
Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

## 3. CÓMO TOMAR FLUNIL

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Comienzo de tratamiento con **Flunil**:
si tiene menos de 65 años, tome 1 comprimidos al día antes de irse a dormir.
si tiene 65 años o más, tome medio comprimido al día antes de irse a dormir.
Probablemente experimentará algunos beneficios durante el primer mes, pero tendrá que tomar el medicamento durante el mes siguiente, antes de sentir el efecto completo del medicamento.
Dosis máxima: No exceder 20 mg/dia (2 comprimidos).

Farmacode

Farmacode

Continuación del tratamiento con Flunil:
Después de dos meses, su médico le indicará si necesita seguir tomando Flunil. La dosis recomendada es la siguiente: Tome el mismo número de comprimidos que acostumbraba a tomar, (1 o medio comprimido al día antes de acostarse) durante 5 días seguidos, y deje de tomarlo durante dos días seguidos (como sábados y domingos). Repita este tratamiento (5 días tomando medicamento seguido de 2 días sin tomarlo) hasta el final del tratamiento.
Debe tomar los comprimidos con un poco de agua.
No debe sobrepasar la dosis recomendada. Los pacientes deben ser controlados de forma regular, especialmente durante el tratamiento de mantenimiento, de modo que puedan detectarse con prontitud los síntomas extrapiramidales (alteraciones del movimiento o de la coordinación) y depresivos, y si aparecieran, suspender el medicamento. Si durante el tratamiento de mantenimiento la eficacia del medicamento disminuyese, se suspenderá el tratamiento.

**Niños**
En niños la dosis usual es de 5mg a 10 mg al día.

**Insuficientes renales e insuficientes hepáticos**
Los datos disponibles no permiten definir la posología en este grupo de pacientes.

**Si toma más FLUNIL del que debe**
Si ha tomado **Flunil** más de lo que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o vaya al hospital más cercano, llevando los comprimidos restantes con usted para informar al médico.
Podrá sentir somnolencia, cansancio o, con cantidades muy elevadas puede sentir agitación y aceleración en el latido del corazón. Entretanto, puede comenzar a tratar estas alteraciones con carbón activado, disponible en la farmacia, que absorbe cualquier medicamento que se encuentre en el estómago.

**Si olvidó tomar FLUNIL**
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**Si interrumpe el tratamiento con FLUNIL**
La duración del tratamiento vendrá determinada por su médico.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos aunque no todas las personas los sufran.
Algunos pacientes pueden sentir somnolencia o cansancio, pero generalmente estos efectos desaparecen espontáneamente. Si no es así y estos le causan malestar, consulte a su médico.
Puede ocurrir aumento de peso y aumento de apetito después de un tratamiento prolongado, por eso evite comer más de lo que es habitual.
Durante un tratamiento prolongado, a veces surge depresión, especialmente en mujeres que ya sufrieron anteriormente depresiones. Las personas ancianas pueden sentir lentitud en los movimientos o rigidez. También puede surgir la incapacidad de quedarse quieto, temblores o movimientos involuntarios de la cara, brazos y piernas. Si siente algunos de estos efectos procure su médico.
Reacciones adversas poco frecuente, incluyen: nauseas, dolor de estómago, sequedad de boca (xerostomía), hiperplasia gingival, insomnio, mareos, irritabilidad.

**Comunicación de efectos adversos**
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

## 5. CONSERVACIÓN DE FLUNIL

**Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.**
Conservar por debajo de 30 ºC, en lugar seco y protegido de la luz.
No utilice este medicamento después de la fecha de expiración indicada en el envase, después de EXP.
La fecha de expiración es el último día del mes que se indica.
No utilice este medicamento si observa indicios visibles de deterioro.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

**Composición de Flunil**
El principio activo es flunarizina (bajo la forma de diclorhidrato de flunarizina). Cada comprimido contiene el equivalente a 10 mg de flunarizina.
Los demás componentes son: lactosa, celulosa microcristalina, hipromelosa, croscamelosa sódica, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio y almidón de maíz.

**Aspecto del producto y contenido del envase**
**Flunil** 10 mg comprimidos está disponible en envases de 2, 20, 50, 60, 100 y 1000 comprimidos.
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**
**LABORATÓRIOS ATRAL, S.A.**
Rua da Estação, n.ºs 1 e 1A
2600-726 Castanheira do Ribatejo
Portugal

Farmacode