

Tomiseptil[®]

Jarabe

Extracto fluido de Tomillo

Por favor lea atentamente este prospecto antes de tomar este medicamento ya que contiene información importante para usted. Se debe siempre tomar este medicamento siguiendo cuidadosamente la información proporcionada en este prospecto o por su médico o su farmacéutico.

- Guarde este prospecto. Podría tener que releerlo.
- Diríjase a su farmacéutico para cualquier consejo o información.
- Si experimenta efectos indeseables, consulte a su médico o su farmacéutico. Esto se aplica también a todo efecto indeseable que no se mencionaría en este prospecto. Ver punto 4.
- Si los síntomas persisten consulte a su médico.

¿Qué contiene este prospecto?

1. ¿Qué es TOMISEPTIL JARABE y en qué caso se utiliza?
2. ¿Qué información debe conocer antes de tomar TOMISEPTIL JARABE?
3. ¿Cómo tomar TOMISEPTIL JARABE?
4. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
5. ¿Cómo conservar TOMISEPTIL JARABE?
6. Contenido del empaque y otra información.

1. ¿QUÉ ES TOMISEPTIL JARABE Y EN QUÉ CASO SE UTILIZA?

Tomiseptil está indicado en caso de dolor de garganta o ronquera y como expectorante en caso de tos asociada a un resfriado.

Este producto es un producto natural medicinal y se debe utilizar en la indicación recomendada.

Este fitofármaco está indicado en adultos y en niños a partir de los 2 años.

Debe consultar a su médico si no experimenta ninguna mejoría o si empeora después de 7 días de tratamiento.

2. ¿QUE INFORMACIÓN DEBE CONOCER ANTES DE TOMAR TOMISEPTIL JARABE?

No tome Tomiseptil Jarabe :

- si es alérgico al tomillo o alguno de los otros componentes contenidos en este medicamento (mencionados en el punto 6);
- si es alérgico a otras plantas que pertenecen a la familia del Lamiaceae.

Advertencias y Precauciones

Consultar a su médico o su farmacéutico antes de tomar Tomiseptil. Debe informar a su médico o a su farmacéutico en los siguientes casos:

- Si constata signos de infección (fiebre, expectoraciones purulentas),
- Si tiene dificultades para respirar.

Niños y adolescentes

Tomiseptil no está indicado en niños menores de 2 años.

Otros medicamentos y Tomiseptil

Se debería evitar el uso concomitante con otros medicamentos que contienen alcohol. Informe a su médico o a su farmacéutico si toma, recientemente tomó o podría tomar cualquier otro medicamento.

Tomiseptil con alimentos y bebidas

No aplica.

Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Al no disponer de información suficiente para excluir cualquier efecto secundario durante el embarazo, no se aconseja el empleo de este fármaco durante dicho periodo.

Conducción y uso de máquinas

No hay evidencia científica respecto al efecto en las habilidades para manejar vehículos o maquinaria.

Tomiseptil contiene sacarosa y alcohol

Este medicamento contiene 8 g de sacarosa por dosis para adultos. Esto debe tenerse en cuenta en pacientes diabéticos.

Este medicamento contiene 10,7% vol de etanol (alcohol), es decir

hasta 1,27 g por dosis para adultos, lo que equivale a 32 ml de cerveza o 13 ml de vino. Peligroso cuando se usa en sujetos alcohólicos. Esto debe tenerse en cuenta en mujeres embarazadas, niños y grupos de alto riesgo como personas con enfermedad hepática o epilepsia.

3. ¿CÓMO TOMAR TOMISEPTIL JARABE?

Asegúrese de tomar este medicamento siguiendo exactamente las instrucciones de este prospecto o las indicaciones de su médico o farmacéutico. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de dudas.

Las dosis recomendadas son las siguientes:

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 15 ml (1 cucharada), hasta 4 veces al día.

Niños a partir de 7 años: 10 ml (2 cucharaditas), hasta 4 veces al día.

Niños a partir de 2 años: 5 ml (1 cucharadita), hasta 4 veces al día.

Es importante respetar un intervalo de al menos 4 horas entre cada toma.

Tome Tomiseptil preferiblemente después de las comidas.

Para una dosificación exacta, usar siempre la copa dosificadora que viene con el producto.

No tomar este medicamento por más de una semana sin indicación de su médico o farmacéutico, si los síntomas persisten o en caso de aparición de fiebre.

Si tomó más Tomiseptil de lo que debía

Contáctese inmediatamente con su médico o su farmacéutico. En caso de sobredosis, se requiere un tratamiento sintomático.

Si olvidó tomar Tomiseptil

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Tomiseptil

Los trastornos podrían eventualmente reaparecer.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pida más información a su médico o farmacéutico.

4. ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

Al igual que otros medicamentos, éste medicamento puede causar efectos secundarios, pero no ocurren sistemáticamente en todos los pacientes. Se observaron en algunos pacientes algunas reacciones de hipersensibilidad así como trastornos gástricos. No se conoce su frecuencia.

Reporte a su médico o farmacéutico cualquier otro efecto secundario que no esté reportado y que se dé durante el consumo de este producto. Esto se aplica también a todo efecto indeseable que no se mencionaría en este prospecto.

Al indicar los efectos indeseables, contribuye a proporcionar aún más información sobre la seguridad del medicamento.

5. ¿CÓMO CONSERVAR TOMISEPTIL JARABE?

Conservar este medicamento a temperaturas inferiores a 30°C.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento claramente indicada en el empaque. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. CONTENIDO DEL EMPAQUE Y OTRA INFORMACIÓN

Lo que contiene Tomiseptil

La sustancia activa es el extracto fluido (1:1) de hojas y flores de tomillo (*Thymus vulgaris* L.) 5 ml de jarabe contienen 750 mg de extracto de tomillo. Solvente de extracción: etanol 22% V/V.

Los otros componentes son: sacarosa, glicerina, etanol y agua purificada.


Aspecto de Tomiseptil y contenido del empaque

Frasco de vidrio de 150 ml de color ámbar, conteniendo jarabe de color marrón claro, de sabor dulce y aromático característico.

Titular del registro y fabricante

Fabricado por Tilman S.A., Bélgica. Distribuido por Heidelg Pharma[®]

Modo de dispensación : Producto natural medicinal de venta libre



CUTTING DIE PLAN & TECHNICAL SPECIFICATIONS			
TYPE	Leaflet		
HxL (mm)	280 x 135 mm		
Support	Paper 50 g/m²		
		Date	12/01/2018
LEGEND			
COLOURS	CMYK		

ARTWORK			
PRODUCT NAME		Notice TOMISEPTIL Amérique Centrale Farma Mark	
PRODUCT CODE		NOT36-002AC/03	
COLOURS & FINISHES			
	CMYK	☐	PANTONE
		☐	PANTONE
	SPOTTED VARNISH	☐	PANTONE
	COLOUR 100-0-50-0	☐	PANTONE
	DATE	3 oct 2024	
	EDITION	1	
	GRAPHIST	Benjamin Castillo	
	P. MANAGER	Alejandra López	