

Zarlem[®] HZ

Antihipertensivo
Comprimidos recubiertos
Vía Oral

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:

Olmesartán medoximilo 20 mg
Hidroclorotiazida 12.5 mg
Excipientes, c.s.

Cada comprimido recubierto contiene:

Olmesartán medoximilo 40 mg
Hidroclorotiazida 12.5 mg
Excipientes, c.s.

DOSIS

Zarlem HZ está indicado en pacientes cuya presión arterial no está adecuadamente controlada por Zarlem (olmesartán medoximilo) como monoterapia. En estos casos puede ser sustituido por Zarlem HZ (20mg de olmesartán medoximilo/12.5 mg de hidroclorotiazida o 40 mg de olmesartán medoximilo/12.5 mg de hidroclorotiazida), según la indicación médica.

La dosis de ZARLEM HZ es de un comprimido al día, se puede tomar con o sin alimentos.

INDICACIONES:

Zarlem HZ 20 mg + 12.5 mg es el tratamiento de la hipertensión esencial.

Zarlem HZ 20 mg + 12.5 mg y 40 mg + 12.5 mg están indicados en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecuadamente controlado con olmesartán medoximilo en monoterapia.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Zarlem HZ es una combinación de un antagonista de los receptores de la angiotensina II, olmesartán medoximilo, y un diurético tiazídico, hidroclorotiazida. La combinación de estos componentes tiene un efecto antihipertensivo aditivo, disminuyendo la presión arterial en mayor grado que cada componente por separado.

Una dosis diaria de Zarlem HZ proporciona una disminución gradual y eficaz de la presión arterial durante el intervalo de dosis de 24 horas.

Olmesartán medoximilo: Olmesartán bloquea los efectos vasoconstrictor y secretor de aldosterona de la angiotensina II mediante el bloqueo de su unión al receptor AT1 en los tejidos, incluyendo la musculatura lisa vascular y la glándula suprarrenal. El antagonismo selectivo de los receptores de la angiotensina II (AT1) produce aumento de los niveles plasmáticos de renina y de las concentraciones de angiotensina I y II, y disminución de las concentraciones plasmáticas de aldosterona. Produce una disminución dosis-dependiente y de larga duración de la presión arterial.

Hidroclorotiazida: El mecanismo del efecto antihipertensivo de los diuréticos tiazídicos no se conoce completamente. Las tiazidas afectan al mecanismo de la reabsorción tubular renal de electrolitos, aumentando directamente la excreción de sodio y cloruros en cantidades aproximadamente equivalentes. La acción diurética de hidroclorotiazida reduce el volumen plasmático, aumenta la actividad de la renina plasmática y la secreción de aldosterona, con los consecuentes aumentos de pérdidas de potasio y bicarbonato en orina, y disminución de potasio en suero. La unión renina-aldosterona está mediada por la angiotensina II, por lo tanto, la administración conjunta de antagonistas de los receptores de la angiotensina II tiende a contrarrestar la pérdida de potasio asociada a los diuréticos tiazídicos.

Zarlem[®] HZ

CONTRAINDICACIONES:

Zarlem HZ está contraindicado en personas que presenten hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. En pacientes con insuficiencia renal, hipopotasemia refractaria, hiperuricemia sintomática, insuficiencia hepática moderada y grave, colestasis y trastornos obstructivos biliares. También está contraindicado si hay uso concomitante con aliskirén. Contraindicado en el segundo y tercer trimestre del embarazo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Si hay historial clínico de cáncer de piel o si se desarrolla una lesión cutánea inesperada durante el tratamiento. El tratamiento con hidroclororiazida, en el caso de dosis altas a largo plazo, puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel y labios. Proteja su piel de la exposición al sol y la radiación ultravioleta mientras toma Zarlem HZ. Debe informar a su médico si hay problemas renales leves a moderados, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, problemas en las glándulas suprarrenales, diabetes, lupus eritematoso y asma.

EFFECTOS ADVERSOS:

Mareos, debilidad, dolor de cabeza, fatiga, dolor en el pecho, hinchazón de los tobillos, pies, piernas, manos o brazos. Entre los efectos poco frecuentes se encuentran las palpitaciones, erupción, eczema, vértigo, tos, indigestión, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, calambres musculares y dolor, dolor en las articulaciones y sangre en la orina.

INTERACCIONES:

El uso concomitante de Zarlem HZ con diuréticos, heparina, laxantes, esteroides, ACTH, carbenoxolona, penicilina G, ácido acetilsalicílico pueden alterar los niveles de potasio en sangre. El uso con AINES puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal. Pastillas para dormir, sedantes y antidepresivos, utilizados al mismo tiempo que Zarlem HZ puede causar una reducción repentina de la presión arterial.

PRESENTACIONES:

Zarlem HZ 20 mg + 12.5 mg

Caja con 28 comprimidos recubiertos

Zarlem HZ 40 mg + 12.5 mg

Caja con 28 comprimidos recubiertos

**PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.**