

Niprox[®]

Antihipertensivo
Comprimidos
Administración oral

COMPOSICIÓN

Amlodipina (como Besilato de amlodipina 6.944 mg).....5 mg
Excipientes.....C.S.

Amlodipina (como Besilato de amlodipina 13.888 mg).....10 mg
Excipientes.....C.S.

DOSIS

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. La dosis inicial recomendada es 5 mg de Amlodipina, una vez al día. La dosis se puede aumentar a 10 mg una vez al día.

INDICACIONES

Amlodipina se utiliza para tratar la presión arterial alta (hipertensión) o un cierto tipo de dolor en el pecho llamado angina, a la que pertenece un tipo poco frecuente que es la angina de Prinzmetal o angina variante.

MECANISMO DE ACCIÓN

Amlodipino es un inhibidor de la entrada de iones calcio del grupo de dihidropiridinas (bloqueante de los canales lentos o antagonista del ion calcio) e impide el paso de los iones de calcio a través de la membrana celular en el músculo cardíaco y en el músculo liso vascular.

CONTRAINDICACIONES

- Si es alérgico a amlodipino, o cualquiera de los demás componentes de este medicamento, o a cualquier otro antagonista del calcio. Esto puede provocar picazón, enrojecimiento de la piel o dificultad para respirar.
- Si tiene la tensión arterial muy baja (hipotensión).
- Si usted tiene en el corazón un estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis aórtica) o shock cardiogénico (una enfermedad en la que el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo).
- Si usted sufre de insuficiencia cardíaca después de un ataque al corazón.
- Embarazo: No ha sido establecida la seguridad de amlodipino durante el embarazo.
- Lactancia: Se ha demostrado que amlodipino pasa a la leche materna en pequeñas cantidades.

Niprox[®]

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Amlodipina.

Usted debe informar a su médico si tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades:

- Ataque al corazón reciente
- Insuficiencia del corazón
- Aumento grave de la tensión sanguínea (crisis hipertensiva)
- Enfermedad del hígado
- Es una persona de edad avanzada y su dosis necesita aumentarse

Amlodipina no ha sido estudiado en niños menores de 6 años. Este medicamento sólo se debe utilizar para tratar la hipertensión arterial en niños y adolescentes de 6 a 17 años. Consulte a su médico.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

INTERACCIONES

Este medicamento puede afectar o puede ser afectado por otros medicamentos, tales como:

- Ketoconazol, itraconazol (medicamentos antifúngicos)
- Ritonavir, indinavir, nelfinavir (también llamados inhibidores de la proteasa utilizados para tratar el SIDA).
- Rifampicina, eritromicina, claritromicina (antibióticos)
- Hypericum perforatum (Hierba de San Juan)
- Verapamilo, diltiazem (medicamentos para el corazón)
- Dantrono (en perfusión para las anomalías graves de la temperatura corporal)
- Tacrolimus (utilizado para controlar la respuesta inmune del cuerpo, permitiendo al cuerpo aceptar el órgano transplantado)
- Simvastatina (medicamento que reduce el colesterol)
- Ciclosporina (inmunodepresor)

Si ya se está tomando otros medicamentos para tratar la presión arterial alta, Amlodipina puede disminuir su presión arterial aún más.

PRESENTACIONES

Niprox 5 mg

Caja x 30 comprimidos

Niprox 10 mg

Caja x 30 comprimidos

**PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.**