

Vidasulin MET[®]

Hipoglucemiante
Comprimidos
Vía de administración oral

COMPOSICIÓN

Cada comprimido de Vidasulin MET 50 MG +
850 MG contiene:
Vildagliptina 50 mg
Clorhidrato de Metformina.....850 mg
Excipientes.....c.s.

Cada comprimido de Vidasulin MET 50 MG +
1000 MG contiene:
Vildagliptina 50 mg
Clorhidrato de Metformina.....1000 mg
Excipientes.....c.s.

DOSIS

- La dosis recomendada es un comprimido de 50 mg/850 mg o de 50 mg/1.000 mg dos veces al día.
- Tome el comprimido con un vaso de agua.
 - La toma del comprimido después de las comidas disminuirá el riesgo de molestias digestivas.

INDICACIONES

Vildagliptina/metformina se utiliza para tratar pacientes adultos con diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes también se conoce como diabetes mellitus no dependiente de insulina. Vildagliptina/metformina se utiliza cuando la diabetes no se puede controlar con dieta y ejercicio solamente y/o con otros medicamentos utilizados para tratar la diabetes (insulina o sulfonilureas).

La diabetes tipo 2 aparece si el organismo no produce suficiente insulina o si la insulina producida no funciona adecuadamente. También puede aparecer si el organismo produce demasiado glucagón.

La insulina y el glucagón se producen en el páncreas. La insulina ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, especialmente después de las comidas. El glucagón promueve la producción de azúcar por el hígado y hace que aumenten los niveles de azúcar en sangre.

MECANISMO DE ACCIÓN

Ambos principios activos, vildagliptina y metformina, ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. El principio activo vildagliptina estimula el páncreas para que produzca más insulina y menos glucagón. El principio activo metformina ayuda al organismo a utilizar mejor la insulina. Este medicamento ha demostrado reducir el azúcar en sangre, hecho que ayudará a prevenir complicaciones de su diabetes.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La administración de vildagliptina/metformina no está recomendada en niños y adolescentes menores de 18 años. Administrarse con precaución en insuficiencia renal y no debe administrarse en insuficientes hepática. No debe utilizarse en embarazo y lactancia.

Vidasulin MET[®]

EFFECTOS ADVERSOS

- Acidosis láctica (muy raro: puede afectar hasta 1 de cada 10 000 personas):
- Angioedema (raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1 000 personas): síntomas que incluyen cara, lengua o garganta hinchadas, dificultad al tragar, dificultad al respirar, aparición repentina de sarpullido o urticaria, que pueden ser indicativos de una reacción llamada "angioedema".
- Enfermedad del hígado (hepatitis).
- Inflamación del páncreas (pancreatitis)
- Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): dolor de garganta, congestión nasal, fiebre, erupción con picor, sudoración excesiva, dolor en las articulaciones, mareos, dolor de cabeza, temblor incontrolado, estreñimiento, náuseas (malestar), vómitos, diarrea, flatulencia, acidez, dolor en el estómago y en la zona del estómago (dolor abdominal).
- Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): fatiga, , debilidad, gusto metálico, niveles bajos de glucosa en sangre, pérdida de apetito, manos, tobillos o pies hinchados (edema), escalofríos, inflamación del páncreas, dolor muscular.
- Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10 000 personas): signos de tener un elevado nivel de ácido láctico en la sangre (conocido como acidosis láctica) como somnolencia o mareos, vómitos y náuseas graves, dolor abdominal, latido irregular del corazón o respiración profunda, acelerada; enrojecimiento de la piel, picor; disminución de los niveles de vitamina B12 (palidez, cansancio, síntomas mentales tales como confusión o alteraciones de la memoria).

INTERACCIONES

- Corticoides, generalmente utilizados para tratar la inflamación
- Agonistas beta-2 generalmente utilizados para tratar trastornos respiratorios
- Otros principios activos utilizados para tratar la diabetes
- Medicamentos que incrementan la producción de orina (diuréticos)
- Medicamentos utilizados para tratar el dolor y la inflamación (AINEs e inhibidores de la COX-2, como ibuprofeno y celecoxib)

PRESENTACIONES

Vidasulin MET[®] 50 mg + 850 mg

Caja con blíster por 30 comprimidos.

Vidasulin MET[®] de 50 mg + 1000 mg
comprimidos.

Caja con blíster por 30 comprimidos.

**PRODUCTO MEDICINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
GUÁRDESE EN UN LUGAR SECO Y FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y HUMEDAD.
ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.**